

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-9-73 576930

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Supplément n° 2 au Bulletin n° 156 du mois de Septembre 1973

14 Septembre 1973

! NOTE VALABLE POUR LA SAISON !
! 1973 - 1974 !

NOTE TECHNIQUE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DE LA LAITUE
CULTIVEE SOUS SERRE EN VUE DE LIMITER LES RESIDUS DE FONGICIDES
AUX TOLERANCES ACTUELLEMENT ADMISES

PREAMBULE

Cette note a été rédigée en conclusion d'expérimentations réalisées depuis 1970 avec des fongicides couramment utilisés. Celles-ci avaient pour but de mettre au point une technique de lutte comprenant des traitements aussi peu nombreux que possible et exécutés à des périodes convenablement choisies, afin de limiter les résidus de fongicides à des quantités ne dépassant pas les tolérances admises par un certain nombre de pays.

Efficacité et limitation des résidus étant deux éléments difficiles à concilier, il importe, pour obtenir les meilleurs résultats, de bien suivre les conseils de cette note qui doivent être appliqués par l'ensemble des producteurs d'une même région.

Ces conseils, valables pour la saison 1973 - 1974, seront, le cas échéant, modifiés par la suite, en fonction des connaissances complémentaires que nous apporteront les expérimentations à venir.

I.- RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL

TERREAU DESTINE A LA CONFECTION DES MOTTES

- Employer un terreau de bonne qualité, pouvant être réhumecté sans difficulté si les mottes deviennent sèches.
- Désinfecter ce terreau, au minimum quinze jours avant son emploi, au moyen de la vapeur, du bromure de méthyle, du dazomet ou du métam-sodium. Avant la confection des mottes, faire le test cresson pour vérifier si le terreau est utilisable.

PEPINIERE

Elle doit être installée dans un lieu bien isolé des autres cultures et de toute source de contamination. Le meilleur moyen est d'utiliser une serre consacrée spécialement à la multiplication.

Mettre en place le plant peu développé.

.../...

PREPARATION DU SOL DESTINE A RECEVOIR LA CULTURE

- Au moment de la plantation, le sol doit contenir une bonne réserve d'eau.
- Si les cultures précédentes étaient atteintes par la Pourriture du collet ou par la Pourriture des feuilles de base, désinfecter superficiellement sur sol prêt à planter avec :
 - . la vapeur, de préférence, sur environ 10 cm de profondeur
 - . ou le quintozène employé en pulvérisation ou en poudrage, à la dose de 15 kg de matière active à l'hectare dans le cas de la Pourriture du collet.

(L'utilisation du bromure de méthyle n'est pas recommandée en raison des risques de résidus importants de brome susceptible d'être retenus par la laitue. Si ce type de désinfection est envisagé avant une culture de laitues, s'assurer que l'on puisse éliminer le brome avant la plantation par un lessivage et prévoir un délai pour le ressuyage du sol).

ARROSAGES

- Eviter d'arroser en période d'humidité prolongée, profiter au contraire des journées ensoleillées. La fréquence et l'importance des arrosages dépendent de la nature du sol, les sols filtrants exigeant des arrosages plus fréquents et moins copieux.
- Bassiner en période de temps chaud ou sec pour compenser l'évaporation intense qui risque de provoquer l'apparition de nécroses sur le bord des feuilles où se développe ensuite la Pourriture grise.
- Eviter d'arroser ou de bassiner le soir.
- Chaque fois qu'il est possible, régler le chauffage et l'aération pour réduire l'humidité de la serre (effectuer de préférence ce réglage en fonction des indications fournies par un thermomètre et un hygromètre enregistreurs).

ELIMINATION DES PLANTES MALADES

- Eliminer régulièrement les laitues qui "coulent" et sur lesquelles s'implante ensuite la Pourriture grise. Les recueillir dans un sac de plastique afin de limiter la dissémination des germes, ce qui ne peut être obtenu avec une cagette.
- Eviter de déposer des déchets de cultures à proximité des serres, ce qui constituerait un foyer d'infection. D'une façon générale, détruire tous les déchets de cultures de laitues dans le voisinage des serres. Cette mesure est extrêmement importante ; elle limite les risques de développement des maladies.
- Au moment de la récolte, éliminer le plus possible de feuilles de base de façon à diminuer les quantités de résidus de pesticides.

II.- LUTTE CHIMIQUE CONTRE LES MALADIES DE LA LAITUE (traitement en cours de végétation)

EN PEPINIERE

L'état sanitaire de la culture dépend essentiellement de la qualité de la protection en pépinières pendant les premiers stades de la végétation. En conséquence, la protection doit être assurée par des traitements effectués tous les cinq jours dès la levée et jusqu'à la plantation, en vue de lutter contre le Mildiou et, si nécessaire, contre le Botrytis.

Les produits à utiliser sont les suivants (doses exprimées en matière active à l'are) :

- contre le Mildiou : zinèbe ou mancozèbe : 16 à 20 g
- contre le Botrytis : thirame : 20 g, bénomyl : 3 g ou méthylthiophanate : 7 g.

A noter que le thirame peut avoir, sur les plantules, une action dépressive.

.../...

DE LA PLANTATION A LA RECOLTE

Quelle que soit l'époque de la culture, il est indispensable d'assurer dès la plantation, une bonne protection des laitues en suivant les recommandations ci-après :

1) A la plantation

- En l'absence d'arrosage après plantation, traiter immédiatement après celle-ci.
- Si la plantation est suivie d'un arrosage, traiter dans les heures qui suivent cet arrosage.

2) Renouvellement des traitements

- Effectuer ensuite des traitements tous les cinq à sept jours suivant la rapidité de croissance des laitues. Il semble que de la mi-Décembre à la mi-Février, cet intervalle puisse être porté à 10 jours, en raison de l'accroissement foliaire très lent à cette époque.

3) Dernier traitement

Pour avoir le maximum de chance d'être au-dessous des seuils de tolérance de résidus, le dernier traitement doit impérativement se situer au plus tard lorsque la culture présente les caractéristiques suivantes :

- les laitues ont atteint le stade de 15 à 18 feuilles (compter toutes les feuilles à l'exception de celles du coeur de moins de 3 cm²).
- les laitues recouvrent environ la moitié de la surface du sol (pour une plantation de 16 laitues au m²).

Ce stade limite se trouve généralement atteint :

- 4 semaines avant la récolte pour les cultures à végétation rapide (récolte en Novembre, Mars et Avril).
- 6 semaines avant la récolte pour les cultures à végétation lente (récolte en Décembre, Janvier et Février).

PRODUITS A UTILISER

Lors de chaque traitement en pulvérisation, il est recommandé d'utiliser un fongicide actif contre le Mildiou et un autre contre le Botrytis.

Les produits conseillés sont les suivants (doses exprimées en matière active à l'are) :

- contre le Mildiou : mancozèbe ou zinèbe : 16 g
- contre le Botrytis : thirame : 20 g, bénomyl : 3 g ou méthylthiophanate : 7 g.

REMARQUE

La lutte contre les ravageurs de la laitue ne pose pas de problème de résidus de pesticides lorsque les insecticides sont utilisés conformément à la réglementation en vigueur.

ARBRES FRUITIERS

- POIRIER -

ANTHONOME DU POIRIER

La présence de l'Anthonome du poirier est très inégale d'une région à l'autre.

La lutte contre ce ravageur n'est à envisager que dans les vergers où des dégâts ont été constatés au printemps dernier (bourgeons évidés).

Traiter au cours de ces prochains jours avec une spécialité à base de lindane (12 g de M.A./hl) ou de méthoxychlore (100 g de M.A./hl).

Les délais d'emploi avant récolte sont à respecter rigoureusement. Ils sont de 15 jours pour le lindane et de 7 jours pour le méthoxychlore.

GRANDES CULTURES

- COLZA -

ALTISES

La sécheresse persistante a pour conséquence de freiner la levée des semis de colza tout en favorisant le développement et l'activité des Altises.

Dès à présent, des dégâts d'Altises sont donc à craindre sur les jeunes plantules, dans les parcelles où la désinfection insecticide des semences n'a pu être réalisée.

Dans les parcelles où les semis ont été effectués avec des semences désinfectées, la protection contre les Altises n'est généralement assurée que jusqu'au stade plantule.

En conséquence, nous invitons les producteurs à visiter fréquemment leurs parcelles (les dégâts d'Altises étant souvent rapides), de façon à intervenir efficacement si la situation l'impose.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER.

Dernière note parue : Supplément n° 1 au Bulletin n° 156 publié le 6 Septembre 1973.